Causas de Vértigo Periférico

- Vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB)
- Enfermedad de Menière
- Neuronitis vestibular

Evaluación General

- Anamnesis
- Otoscopía
- Evaluar trastornos motores
- Pruebas:
 - Estáticas:
 - Romberg
 - Romberg laberíntico
 - Romberg sensibilizado
 - Brazos extendidos de Barré
 - Dinámicas:
 - Marcha en estrella de Babinski-Weil
 - Prueba de Utemberger
 - 40 pasos
 - Tolerancia de 45°

Copia N°:	Representante de la Dirección:	Fecha:
	<i>Revisó</i>	<i>Aprobó</i>
<u>Nombre</u>	Dr. Leonardo Gilardi	Dra. Inés Morend
<u>Firma</u>		
<u>Fecha</u>	04/07	19/07

Enfermedad de Menière

Generalidades

Es una afección del oído interno de causa desconocida, caracterizada por hipoacusia fluctuante, ataques de vértigo, acúfenos y sensación de oído lleno. Se considera causada posiblemente por la malabsorción de endolinfa en el saco endolinfático.

La incidencia de la enfermedad se ha estimado en 4 / 100 mil en Japón, 160 / 100 mil en Gran Bretaña y 15 / 100 mil en Estados Unidos. Se observa predominio leve en mujeres. Puede aparecer a cualquier edad, con un pico en la 3ta y 4ta década.

Clínica

La afección es bilateral en el 50% de los casos. La historia natural de esta afección no es homogénea; la frecuencia y duración de los ataques de vértigo son variables y resulta difícil evaluar el efecto de las diferentes terapias. La remisión espontánea es destacable. La hipoacusia es variable y puede llegar a la cofosis.

Los acúfenos pueden persistir o remitir. Afectan a cerca del 90% de los pacientes y constituyen el síntoma único en el 5% de los enfermos. Puede preceder por años al cuadro completo. La etiología exacta es desconocida y el tratamiento es sólo sintomático.

Tratamiento de las Crisis

- Hidroclorotiazida (25 mg cada 8 h): tiene efecto a corto plazo en el control del vértigo, no así a largo plazo en el control de la enfermedad.
- Diazepam (5 a 10 mg por día)
- Sedantes laberínticos (Retardan la compensación y habituación central)
 - Dimenhidrinato (50 a 100 mg, 3 a 4 veces por día)
 - Difenhidramina
 - Prometazina
- Antiemético central: ondansetrón (8 mg hasta 3 veces por día)

Tratamiento entre las Crisis

- Vasodilatadores:
 - Cinarizina (12.5 mg cada 8 h)
 - Flunarizina (10 mg cada 24 h)
 - Betahistina (8 a 16 mg cada 8 h)
- Dieta
 - Alimentos frescos, poco alergénicos y con poco sodio en su composición.
 - Dieta rica en proteínas y baja en carbohidratos, sin colesterol ni triglicéridos
 - Peso corporal adecuado.
 - Eliminar toxinas (café-tabaco-alcohol).

VPPB

Se caracteriza por ataques de vértigo rotatorio, desequilibrio postural y, a veces, náuseas. La afección se desencadena al sentarse desde una posición supina (a la mañana), al acostarse en la cama, al darse vuelta hacia un costado en posición horizontal o ante la extensión o flexión del cuello.

Nistagmo en el VPPB

- Latencia: comienza luego de al menos 1 s, e incrementa su gravedad progresivamente
- Duración menor a 40 s
- Nistagmo rotatorio horizontal: con la fase rápida hacia el oído de abajo (geotrópico)
- Reversible: el vértigo y el nistagmo son de menor violencia y en la dirección opuesta
- Fatigabilidad: con la repetición de las pruebas, los síntomas son más leves

Curso Natural

Resuelve espontáneamente en la mayoría de los pacientes. En casos no tratados, persiste en el 20% a 30 % de los enfermos. Se considera una afección benigna, pero que puede recurrir en un 30% en un período variable (años).

Maniobra de liberación de Semont

Neuronitis Vestibular

Consiste en la parálisis vestibular unilateral idiopática; se define como la 3ra causa de vértigo periférico, luego del VPPB y la enfermedad de Menière. La incidencia anual se estima en 3.5 / 100 mil habitantes. Se ha demostrado latencia del virus del herpes simple tipo 1.

Clínicamente se caracteriza por vértigo rotatorio grave de comienzo agudo o subagudo, con nistagmo rotatorio horizontal, inestabilidad y náuseas sin hipoacusia. Se asocia con frecuencia con cuadros de vía aérea superior.

Es relativamente infrecuente en niños de entre 3 y 15 años, entre quienes predomina en los varones. Se diferencia de la afección de los adultos por la mayor frecuencia de cuadros de vía aérea superior, la recuperación más rápida del vértigo y el nistagmo y el mejor pronóstico y recuperación laberíntica.

Tratamiento

- Dimenhidrinato (50 a 100 mg cada 6 h) y hioscina (0.6 mg cada 6 a 12 h): disminuyen la descarga de los núcleos vestibulares y la reacción neuronal a la rotación del cuerpo. Se administran hasta que desaparezcan las náuseas.
- Corticoides
- Antivirales
- Rehabilitación vestibular

Bibliografía

1. Suárez Hamlet, Velluti RA, 2001. La Cóclea: Fisiología y Patología. Trilce Ediciones, Uruguay, 139-158.
2. Diamante Vicente, 2004. Otorrinolaringología y afecciones conexas. El Ateneo.
3. Gil Carcedo LM, 2004. Otología, Editorial Panamericana, Cap: 8, 26,27, 28 y 29.